

Bloedvaten dotter röntgenonderzoek - angiografie

U heeft in overleg met uw arts besloten tot een doorlichtingsonderzoek met contrastmiddel. Het contrastmiddel zorgt dat delen van het lichaam zichtbaar zijn op röntgenfoto's. In deze folder leest u meer over de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek.

Bent u overgevoelig voor bepaalde genees- of contrastmiddelen? Dan verzoeken wij u dringend dit vóór het onderzoek te melden aan de behandelend arts of de radiodiagnostisch laborant.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, of denkt te zijn, neem dan vóór het onderzoek contact op met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Tijdens de zwangerschap maken we liever geen röntgenfoto's, tenzij het echt noodzakelijk is.

Vorbereiding

- Voor deze behandeling mag u gewoon eten en drinken. Eet niet te veel voor de behandeling. Heeft u een afspraak in de ochtend? Neem dan een licht ontbijt met bijvoorbeeld beschuit of crackers.
- Wij raden u aan om mee te nemen: eenvoudige kleding, pantoffels of slippers (geen gladde zool), toiletartikelen en iets te lezen.

Stop uw medicijnen altijd in overleg met uw arts!

Medicatie	Stoppen?	Wanneer?	Hervatten?
Acenocoumarol (Sintrommitis)	Ja	3 dagen van tevoren	dag na interventie
Fenprocoumon/Marcoumar	Ja	5 dagen van tevoren	dag na interventie
NOAC's, zoals Rivaroxaban	Ja	24 uur van tevoren of eerder bij nierfunctie stoornissen	dag na interventie
Innohep	Ja	24 uur van tevoren	dag na interventie
Acetylsalicylzuur (Ascal)	Nee		
Clopidogrel (Plavix, Grepid)	Nee		

Het onderzoek en eventuele behandeling

- Onder lokale verdoving krijgt u een katheter in een van de liesslagaders en soms ook in de arm.
- De katheter schuiven we naar het af te beelden gebied.
- Als de katheter op de juiste plek ligt, spuit de radioloog de contrastvloeistof in waardoor de bloedvaten zichtbaar worden op het beeldscherm. Tegelijkertijd worden de foto's gemaakt.
- De contrastvloeistof kan een warm gevoel geven. Dat is normaal en dit gaat snel over.
- Na het maken van de foto's volgt de afgesproken behandelingen
 - **PTA**. Dit heet ook dotteren. Door deze behandeling wordt de vernauwing of verstopping opgerekt met een ballonnetje. Het ballonnetje wordt via de katheter naar de plaats van de vernauwing of verstopping gebracht. Door het ballonnetje op te blazen proberen we de vernauwing of verstopping weg te drukken.
 - **Stent**. Als de PTA-behandeling niet het gewenste resultaat oplevert, plaatsen we een stent met behulp van de katheter. De stent blijft achter om het bloedvat open te houden.
- Na het onderzoek verwijderen we de katheter uit de slagader en sluiten we de aanprikplaats via een van de volgende manieren:
 - Stevig dichtdrukken van de aanprikplaats gedurende 10 min stevig dichtdrukken met daarna een drukverband.
 - Via 'Closure device'. Dit zijn hulpmiddelen, zoals een angio-seal, die het gaatje in de slagader sluiten. Als dat gebeurd is, krijgt u een pleister op de aanprikplaats.
- Het onderzoek en/of behandeling duurt ongeveer 2 uur.

Na het onderzoek

Na het onderzoek of behandeling gaat u terug naar de verpleegafdeling. U moet dan de 2 tot 4 uur op uw rug liggen. U mag niet uw hoofd optillen of uw knie zelfstandig strekken of buigen. U kunt eten en drinken mits u blijft liggen.

De uitslag

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, krijgt binnen 5 dagen de uitslag van het onderzoek.

Naar huis

Van uw behandelend arts hoort u wanneer u weer naar huis kunt. Soms moet u een nacht blijven maar meestal gaat u dezelfde dag weer naar huis. Als u dezelfde dag naar huis gaat, zijn de volgende punten belangrijk:

- U mag zelf geen vervoermiddel besturen en geen gebruik maken van het openbaar vervoer. Zorg daarom dat iemand u met de auto vervoert naar uw verblijfadres. U kunt ook gebruik maken van een taxi, maar alleen onder begeleiding. De portier bij de ingang bestelt graag een taxi voor u. De kosten van deze taxirit zijn voor eigen rekening.
- Zorg dat er tot de ochtend na uw opname en tijdens de nacht iemand bij u is om u te helpen bij eventuele problemen.
- U krijgt een nazorgformulier en een afspraak voor op de polikliniek.

Aandachtspunten

- Het drukverband mag u pas na 24 uur verwijderen.
- Heeft u een 'Closure device' gekregen? Dan krijgt u een kaartje met deze informatie. U moet dit kaartje 90 dagen bij u dragen.
- De eerste 24 uur na de behandeling raden wij af uw benen hoog op te tillen (beperkte heupflexie tot maximaal 90 graden). Doe het de eerste dagen rustig aan; niet teveel trappenlopen en geen zware dingen tillen.
- Tot 3 dagen na de behandeling moet u veel drinken om zo snel mogelijk de contrastvloeistof uit te plassen.

Vragen?

Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/vergoeding-kosten-behandeling

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online

- www.olvg.nl/radiologie

Contact

afdeling Radiologie, locatie Oost

T 020 599 33 25 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

E radiologieoosterpark@olvg.nl

Route C1

afdeling Radiologie, locatie West

T 020 510 88 98 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

E radiologie.afdeling@olvg.nl

Route 15

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl | Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 24 oktober 2023, foldernr.3277