

Voorhoofdslap

U heeft van uw dermatoloog te horen gekregen dat er sprake is van een kwaadaardigheid van de huid in het gelaat, in vele gevallen op de neus. De dermatoloog zal de kwaadaardigheid weghalen via Mohs-techniek en u uitleggen wat dit inhoudt. De wond wordt daarna door uw plastisch chirurg gesloten doormiddel van een voorhoofdslap.

Het eerste gesprek

Tijdens het eerste consult weet de plastisch chirurg nog niet hoe groot het defect precies zal zijn. De verwachting van de dermatoloog en de plastisch chirurg is echter dat het defect bij u gesloten dient te worden met een voorhoofdslap.

Tijdens het eerste consult bespreekt de plastisch chirurg met u de operatie. Ook worden eventuele allergieën en uw medicatie gebruik besproken, neemt u dus een actuele medicatielijst mee. De plastisch chirurg zal daarna lichamelijk onderzoek verrichten en een aantal zaken opmeten. Tot slot worden er na het consult door de medisch fotograaf foto's gemaakt voor in uw dossier.

Vorbereiding

Gebruikt u bloedverdunners? Uw arts bespreekt met u of u moet stoppen met uw medicatie, en wanneer u moet stoppen. Stop nooit met uw medicijnen zonder overleg met de arts! Voor de operatie moet u nuchter zijn, u hoort dit via uw arts en anesthesist. Dat betekent dat u tot enkele uren voor de operatie niet mag eten en drinken, hierover zal de anesthesist u informeren. **Als u zich niet aan deze afspraken houdt, kan uw operatie niet op de afgesproken tijd doorgaan.**

Indien u rookt wordt u dringend verzocht 6 weken voor de operatie te stoppen.

Nicotine vermindert de doorstroming van bloed door de weefsels wat een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het weefsel en daarmee de wondgenezing. Hierdoor is er een grotere kans op complicaties zoals infectie en weefselversterf.

Verder wordt u verzocht voorafgaand aan de operatie geen bodylotion/crèmes te gebruiken en u te ontdoen van sieraden zoals ringen/horloges. Na de operatie kunt u niet autorijden of fietsen, zorg daarom voor gepast vervoer naar huis.

De operatie

Een voorhoofdslap is een operatie die meestal uit twee of drie stappen bestaat.

De eerste operatie is onder algehele narcose. De huid wordt van uw voorhoofd gehaald en op zijn bloedtoevoer omgeklapt zodat deze op de neus kan worden geplaatst. De huidbrug die blijft staan, bevat de bloedvoorziening van deze huidlap welke zich aan de binnenzijde van de wenkbrauw bevindt. Deze huid van het voorhoofd heeft een aantal weken nodig om in te groeien op de nieuwe plek op de neus.

De wond op het voorhoofd wordt gesloten middels niet oplosbare hechtingen. Indien deze wond niet geheel gesloten kan worden, wordt er gebruik gemaakt van een huidtransplantaat. Dit zal worden ingehecht waarna er een gaasje op wordt gehecht (tie-over) welke druk geeft op het huidtransplantaat om het goed in te laten groeien.

Er zijn altijd 1 of 2 aanvullende operaties nodig (onder lokale verdoving) voor het verfraaien van de reconstructie. Zoals het uitdunnen van de lap en het doornemen van de huidbrug indien de huidlap goed is ingegroeid op de neus. De wonden worden met niet-oplosbare hechtingen gesloten.

Na de operatie

Na de operatie mag u meestal dezelfde dag nog naar huis. De wond is afgeplakt. Probeer het hoofd zoveel mogelijk hoog te houden, niet te bukken en een extra kussen onder het hoofd te leggen tijdens de nacht. Probeer andere druk verhogende momenten zoals niezen en hoesten zoveel mogelijk te mijden.

Na 1 week wordt op de polikliniek de wond beoordeeld, dan worden ook de eventuele tie-over en hechtingen verwijderd.

De eerste weken na de operatie is het operatiegebied gezwollen en kan er zich een bloedingstoring voordoen. Dit kan een trekkend gevoel op de wonden geven, ook kan de bloedingstoring uitzakken naar bijvoorbeeld de oogkassen of wangen. Gemiddeld duurt het 6 weken tot de zwelling weg is, de bloedingstoring is in ca 2 weken opgelost. In het begin kan de huid rondom het litteken gevoelloos zijn. Dit geeft over het algemeen weinig klachten en wordt vaak in de loop der jaren kleiner.

Indien u geen pijnmedicatie mee naar huis krijgt mag u als u pijn heeft maximaal 4x per dag 2 tabletten paracetamol van 500mg innemen. Als dit niet voldoende is mag u contact opnemen met onze polikliniek. De eerste 4-6 weken wordt u verzocht niet zwaar te tillen of te sporten.

Het resultaat

Het eindresultaat is afhankelijk van meerdere factoren:

- De grootte en locatie van het defect
- Conditie van de huid
- Wondgenezing. Hoe uw wond geneest
- Littekenvorming De vorming van uw littekens
- Mogelijke complicaties

Complicaties

Bij elke operatie is er een kans op complicaties.

Een nabloeding

Hierbij gaan er bloedvaten die tijdens de operatie dicht gemaakt zijn weer open. Hoesten, persen, of een plotselinge verhoging van de bloeddruk kan hiervan de oorzaak zijn. Indien zich teveel bloed ophoopt, moet u nogmaals worden geopereerd. De bloeding wordt dan gestopt.

Een infectie

Als u een infectie krijgt wordt de huid warm, rood, gezwollen en het kan pijnlijk zijn. Soms is het nodig de wond iets te openen of moet u antibiotica krijgen.

Hypertrofische littekens

Het litteken kan onderling verschillen. Sommige patiënten maken geen fraaie littekens en krijgen dikke, zichtbare littekens.

Opengaan van de wond

Hierbij wijkt een deel van de wondranden tussen de hechtingen of doet dit zich voor na het verwijderen van de hechtingen. Dit geneest over het algemeen vanzelf, echter duurt het wat langer dan bij een goede wondgenezing

Afsterven weefsel/huidtransplantaat

Indien er sprake is van een lokale huidtranspositie of het gebruik van een huidtransplantaat is het belangrijk om te weten dat deze huid opnieuw in moet groeien op de nieuwe plek, de plek waar eerst het defect zat. Het komt voor dat een deel van de huidplastiek of het huidtransplantaat niet goed aanslaat en zal afsterven. In sommige gevallen is er dan een tweede operatie nodig.

Vergoeding zorgverzekeraar

Deze ingrepen worden meestal vergoed door uw zorgverzekeraar.

Vragen?

Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota. Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online

- www.olvg.nl/plastische_chirurgie

Contact

polikliniek Plastische Chirurgie, locatie Oost

T 020 510 86 70 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

P4

polikliniek Plastische Chirurgie, locatie West

T 020 510 86 70 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

Route 06

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl | Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 24 maart 2021, foldernr.4210