

# Niet ingedaalde zaadbal (testikel) bij kinderen

Normaal gesproken zitten bij de geboorte beide testikels bij jongetjes in de balzak. Soms daalt één of beide zaadballen echter niet in, en blijft in de buik of lies zitten. Dan vindt een operatie plaats, die orchidopexie wordt genoemd.

## Duur van de behandeling

Voor de ingreep wordt het kind meestal een dag in het ziekenhuis opgenomen.

## Voor de behandeling

### Vervoer

Wij raden aan vervoer te regelen voor na de ingreep.

## De behandeling

- De uroloog maakt een sneetje in de lies en een sneetje in de balzak.
- Via de opening in de lies wordt de zaadbal opgezocht en vrijgemaakt.
- De bloedvaten en de zaadleider van de testikel worden vrijgemaakt van de omgevende weefsels. Hierdoor kan voldoende lengte verkregen worden om de testikel naar de balzak te brengen, waar die wordt vastgezet.
- Als de uroloog tijdens de operatie een liesbreukje vaststelt, wordt dit meteen verholpen.
- De huidwond in de lies en balzak worden meestal met oplosbare hechtingen gesloten.

## Na de behandeling

### Op de afdeling

Eén ouder mag aanwezig zijn als het kind wakker wordt op de uitslaapkamer. Als het kind goed wakker is, gaat hij terug naar de kinderafdeling.

### Naar huis

Als alles goed gaat mag het kind meestal dezelfde dag naar huis. Het kind moet het liefst met de auto naar huis gebracht worden, en het is fijn als er iemand bij het kind achterin kan zitten om extra aandacht te geven als dat nodig is.

### Controleafspraak

Ongeveer een week na de operatie wordt het wondje op de polikliniek gecontroleerd.

## Weer thuis

### Leefregels en adviezen

Kinderen geven over het algemeen prima zelf aan wat ze wel en niet kunnen. Meestal hebben ze weinig pijn en zijn ze al na een paar dagen weer de oude.

- Het is beter de eerste twee weken niet te sporten, gymnastiek te doen, te zwemmen of te fietsen en wilde spelletjes te vermijden.
- Op de dag na de operatie mag uw kind kort douchen of even in bad. Na een dag of drie kan dat weer de normale tijd duren.
- Mocht de pleister van de wond afgaan dan kunt u deze verder weglaten. Eventuele luiers kunt u het beste wat vaker verwisselen.

### Bijverschijnselen

Het is normaal dat de balzak na de operatie een beetje gezwollen is en er blauwroodachtig uitziet. Er kan een nabloeding optreden die zich meestal uit in een bloeduitstorting onder de hechting. Meestal verdwijnt die vanzelf en is behandeling niet nodig.

### Complicaties en contact

Soms treedt een stoornis in de wondgenezing op in de vorm van een infectie of een abces. Neem daarom bij koorts of hevige pijn contact op met het ziekenhuis.

### Weer naar school

Als uw zoon fit genoeg is mag hij na een week weer naar school.

De informatie over de behandeling is bedoeld als aanvulling op het gesprek met de arts. De algemene aard van de informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Heeft u nog vragen, stel die dan gerust aan de arts of verpleegkundige. Of bel met de afdeling Urologie.

## Vragen?

### U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op [www.olvg.nl](http://www.olvg.nl)  
Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op [www.olvg.nl/zorgnota](http://www.olvg.nl/zorgnota)

### Contact

**polikliniek Kindergeneeskunde, locatie West**

T 020 510 88 90 (ma t/m vrij 8.00 – 16.30 uur)

Route 32

### Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?

Bel dan zo snel mogelijk met de afdeling. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Algemene voorwaarden: [www.olvg.nl/algemene\\_voorwaarden](http://www.olvg.nl/algemene_voorwaarden)

Klacht of opmerking: ga naar [www.olvg.nl/klacht](http://www.olvg.nl/klacht)

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, april 2017\2573