

# Stentplaatsing in slokdarm, dunne of dikke darm

U laat een buis (stent) in de slokdarm, dunne of dikke darm plaatsen. Deze ingreep is nodig, omdat er een vernauwing zit in de slokdarm, dunne of dikke darm. Hierdoor kan voedsel en soms ook vocht moeilijk door de slokdarm gaan. Bij een vernauwing in de dikke darm gaat het ontlasten moeilijk.

Door plaatsing van de buis kunt u weer beter eten en drinken of kan de ontlasting weer door de darm gaan. De ingreep vindt plaats tijdens een röntgenonderzoek. In deze folder geven wij u informatie over de ingreep.

Het onderzoek begint met een uitgebreide voorbereiding. Hieronder volgen de instructies. Zonder deze voorbereiding kan het onderzoek niet doorgaan.

## Uw afspraak

- Locatie Oost: meldt u zich bij de Endoscopie- en Behandelafdeling
- Locatie West: meldt u zich bij de afdeling Endoscopie

## Medicijnen voor het onderzoek

- Stop nooit op eigen initiatief met uw medicatie, overleg hierover altijd met uw arts.
- Gebruikt u medicijnen, met name bloedverdunners, overleg dan ruim van te voren met uw arts of u hiermee door moet gaan.
- Als u insuline gebruikt, neemt u dan uw bloedsuikermeter en de insuline mee naar het ziekenhuis.
- Neem uw actueel medicatie-overzicht mee (gratis via uw apotheek)

## Overige aandachtspunten

- Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Meld dit dan aan de arts.
- Draagt u een pacemaker of defibrillator? Neem dan uw pas met het serienummer mee.
- Wordt u behandeld met chemotherapie? Meld dit dan aan de arts

Krijgt u sedatie? Volgt u dan ook de instructies uit de folder 'Sedatie, onderzoek terwijl u licht slaapt' of 'Sedatie met propofol bij operatie, onderzoek of behandeling'. U ontvangt deze op de polikliniek.

## Vorbereidingen thuis

### Stent in de slokdarm of dunne darm

Het onderzoek kan alleen uitgevoerd worden als uw slokdarm, maag of dunne darm leeg zijn.

- *Is uw onderzoek voor 12 uur:*  
u mag vanaf 24.00 uur 's nachts voor het onderzoek niet meer eten en drinken.
- *Is uw onderzoek na 12 uur:*  
u mag tot zes uren voor de ingreep een licht ontbijt nemen, bijvoorbeeld een kopje thee met een beschuitje. Daarna mag u niets meer eten en drinken. U mag wel uw medicijnen innemen met een beetje water.

### Stent in de dikke darm

De dikke darm moet schoon zijn als de stent geplaatst wordt. U krijgt hiervoor laxeermiddelen, meestal kleanprep of moviprep. Soms spoelen wij uw darm schoon met een klyisma. Deze wordt in het ziekenhuis ingebracht. Uw behandelend arts informeert u welke laxeermiddelen u moet gebruiken.

## De behandeling

### Verdoving

#### *Stent in de slokdarm of dunne darm*

U kunt een keelverdoving krijgen door een spray achter in de keel. Hierdoor heeft u tijdens de ingreep minder last van kokhalzen. Naast een keelverdoving krijgt u meestal een infuus met medicijnen om te slapen (roes).

#### *Stent in de dikke darm*

U krijgt meestal een infuus met medicijnen om te slapen (roes).

### De ingreep

De ingreep begint met een endoscopie in de maag of darm. Meer informatie hierover staat in de folder 'Gastroscoopie' of 'Coloscopie'. Tijdens de endoscopie schuift de arts de stent tot op de plek van de vernauwing.

Er kunnen röntgenfoto's gemaakt worden tijdens de plaatsing van de buis. Zo controleren we of de positie van de buis goed is. Meestal voelt u de buis niet. Soms voelen patiënten een drukgevoel van binnen. Als u voor de ingreep pijn heeft, kan die na het plaatsen van de buis soms wat toenemen.

### Na de ingreep

#### *Stent in de slokdarm of dunne darm*

- Als u wakker bent, krijgt u in het bijzijn van de verpleegkundige een slokje water. Als u hier verder geen klachten van krijgt, mag u weer eten en drinken.
- U kunt meestal weer naar huis.
- Via de diëtist en/of behandelend arts krijgt u informatie over wat u mag eten en drinken.
- U krijgt na de ingreep maagzuurremmende medicijnen voorgeschreven.

- Vaak heeft u wat pijn na de ingreep en de volgende dagen, omdat de buis zich uitzet en drukt op de omgeving. Met een eenvoudige pijnstillers is dit goed te bestrijden.

### **Stent in de dikke darm**

- U krijgt na het plaatsen van de stent altijd laxeremiddelen voorgeschreven om thuis te gebruiken.
- Via de diëtist en/of behandelend arts krijgt u informatie over wat u mag eten en drinken.
- U kunt meestal weer naar huis.

### **Duur van de ingreep**

De voorbereiding en de ingreep duren ongeveer dertig minuten.

### **De uitslag**

De verwijzend arts geeft tijdens uw volgend polikliniekbezoek van de definitieve uitslag. De endoscopieverpleegkundige mag de uitslag niet geven. Heeft u andere vragen over het onderzoek, dan kunt u deze aan de endoscopieverpleegkundige stellen.

### **Complicaties**

- Een stent plaatsen is een veilige ingreep. Als de slokdarmvernaauwing in het gebied vlak naast de luchtpijp zit, bestaat er altijd een risico dat de luchtpijp wordt samengedrukt en er benauwdheid ontstaat. Wanneer dit optreedt, wordt de stent niet geplaatst, maar zoeken we samen met de (long)arts naar een andere oplossing.
- Hoe nauwkeurig de stent ook geplaatst is, er is altijd kans op verschuiven door de bewegingen in de (gehele) darm. De stent moet dan opnieuw geplaatst worden.

Krijgt u tijdens de eerste 24 uur na de ingreep klachten die u voor de behandeling nog niet had, zoals hevige pijn, koorts of bloedverlies?

Neem dan tussen 8.15 en 16.15 uur contact op met de Endoscopie- en Behandelafdeling. Buiten deze uren kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp.

- Krijgt u 24 uur na de ingreep klachten, neem dan contact op met uw huisarts.

## Vragen?

### Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op [www.olvg.nl/vergoeding-kosten-behandeling](http://www.olvg.nl/vergoeding-kosten-behandeling)

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op [www.olvg.nl](http://www.olvg.nl) maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

### Meer informatie online

- [www.olvg.nl/mdl](http://www.olvg.nl/mdl)

### Contact

#### Endoscopie- en Behandelafdeling (EBA), locatie Oost

T 020 510 87 77 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

#### afdeling Endoscopie, locatie West

T 020 510 81 76 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

Route 16

#### Na 16.15 uur en in het weekend

#### afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost

T 020 599 30 16

#### afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie West

T 020 510 81 61

Oost  
Oosterpark 9  
1091 AC Amsterdam

West  
Jan Tooropstraat 164  
1061 AE Amsterdam

Spuistraat  
Spuistraat 239 A  
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: [www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden](http://www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden)

Aanmelden MijnOLVG via [www.mijnolvg.nl](http://www.mijnolvg.nl) | Klacht of opmerking: [www.olvg.nl/klacht](http://www.olvg.nl/klacht)

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 16 maart 2022, foldernr.0376